肺癌及大腸癌為香港常見癌症,本港十大癌症死亡率 中又以肺癌居首, 其次為於大腸癌。

- 吸煙
- 長期吸入二手煙
- 因職業關係曝露於化學品或建築物料 (如: 石棉)
- 吸煙者如經常曝露於污染的空氣, 會增加患癌風險

年紀愈大患上大腸癌的機會愈高,50歲以上的人士 更要加倍注意, 大腸癌的高危因素包括:

- 高動物脂肪和低纖維的飲食習慣
- 曾有家人患上大腸癌或遺傳性腸病
- 結腸長期發炎或長出瘜肉

智龄資訊由「賽馬會智龄匯」計劃提供, 如欲索取更多智龄工具的資料, 歡迎聯絡:









- 聲音嘶啞、持續咳嗽、痰中帶血
- 容易疲倦、食慾不振、體重下降
- 胸肺反覆受到感染或經久難癒
- 胸部不適, 咳嗽或深呼吸時感到疼痛

- 腹部不適: 絞痛、腹脹、有腫塊
- 鎖骨上淋巴腺腫大
- 大便直徑改變、帶血、帶有大量黏液
- 大便習慣持續有改變 (腹瀉或便秘)





及早作出小改變,便能預防或減少患上肺癌/大腸癌的風險:

- 避免吸煙和吸入他人的二手煙
- 即使你已吸煙多年,戒煙絕對為時未晚
- 遵從職業安全及健康規定 (適當地使用保護用具,減少接觸致癌物)

- 減少進食紅肉和加工肉食; 多吃高纖維食物
- 恆常進行體能活動
- 保持適當體重及腰圍
- 不吸煙、不酗酒



部份年齡層和具其他風險因素的人士應定期進行癌症篩查; 問問醫生意見, 是否適合做篩查、用哪一種篩查方法:

- 胸肺 X 光檢查
- 痰液細胞分析
- 低劑量電腦斷層掃描

- 大便隱血測試
- 乙狀結腸鏡檢查
- 大腸鏡檢查
  - \*衛生署「大腸癌篩查計劃」資助50至75歲沒有症狀的香港居民 在私營機構進行篩查



台次 醫生會根據癌病的種類、腫瘤大小、患者是否有其他病態等向患者建議最佳的治療方法,如外科手術、放射治療、 藥物治療

# 

- 利用智龄工具自我管理身體狀況,有助長者預防患上嚴重癌症
- 手術後的傷口或造口護理尤其重要,患者可選擇特別設計、方便穿脫的的智齡衣物
- 善用附有提醒功能的智齡藥盒,有助避免患者誤服、漏服或重覆服用所需藥物
- 化療期間患者抵制力下降,照顧者及患者應注意個人衛生,多利用智齡消毒工具,以減低感染的風險

資料來源:衛生署、香港防癌會、賽馬會智龄匯

